

PASTA LUMACHICIDA IN GRANI PFnPE

PASTA LUMACHICIDA IN GRANI PFnPE si presenta sotto forma di granuli piccoli, regolari, perfettamente essiccati. Particolare caratteristica di questo prodotto consiste nel potere attrattivo verso i molluschi cui è destinato e nella durata della sua efficacia. Infatti i granuli resistono anche all'azione dissolvente della pioggia, permanendo nel terreno fino a quando sono stati interamente mangiati.

COMPOSIZIONE di g 100:

Metaldeide pura g 4,95
Coformulanti* q.b. a g 100

**contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ITAL-AGRO S.r.l. – Via V. Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO) – Tel. 0371 71090
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia);
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Z.I. La Sorgaglia - Arre (PD)
KOLLANT S.r.l. - Via Trieste 49/53 - 35121 Padova (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2259 del 06.07.1976

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02.05.2020

Peso netto gr 200 - 500 - Kg 1 - 5

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Sp1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

Consigli medici di massima e condizionati al caso.

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: Ben noti sono i danni, spesso ingenti, che taluni parassiti tipo dei Molluschi, appartenenti alla classe dei Gasteropodi, sottoclasse dei Polmonati, arrecano ai vegetali, specialmente durante le stagioni piovose. Tra i più dannosi si menzionano la specie dei generi HELIX, provviste di conchiglia, e LIMAX, senza conchiglia. Detti parassiti si nutrono di qualunque vegetale, preferendo però le parti tenere delle piante da orto e da giardino e i semi germoglianti. Per la radicale disinfestazione occorre spargere, alla volata o a strisce, circa g 42-70 di PASTA LUMACHICIDA IN GRANI PFnPE per 100 mq. sulle colture riportate nella tabella sottostante.

I vantaggi di questo prodotto possono riassumersi come segue:

- la grande quantità di granelli consente trattamenti più estesi e più intensivi
- la composizione evita lo sfaldamento dei granelli, anche se immersi per lungo tempo in acqua;
- ha maggior potere attrattivo non essendo composto di crusca, bensì di farine varie e di sostanze appetite dalle lumache;
- permane nel terreno fintanto che non è stato interamente mangiato

COLTURA	N. appl.	DOSE Kg/ha	Giorni * pre-raccolta
LATTUGHE E SIMILI (Lattughe, Crescione, Dolcetta, Scarola/Indivia, Cicorie (esclusa Witloof), Radicchi, Barbarea, Rucola, Senape nera, Foglie e germogli di <i>Brassica spp.</i> , etc.);	2-3	6-7	20
CAVOLFIORI	2-3	4.2	7
CARCIOFI solo in pieno campo	2-3	4.2	7
CAVOLI CAPPUCCIO (Cavolo cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo verza, Cavolo bianco) solo in pieno campo	2-3	4.2	7
SPINACI E SIMILI (Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.)	2-3	6-7	20
ERBE FRESCHE (Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Menta peperita, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo, Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello, etc.)	2-3	6-7	20
FLOREALI ed ORNAMENTALI	2-3	6-7	--

Per le colture sotto riportate, il prodotto si impiega esclusivamente per uso perimetrale (distribuire lungo tutti i bordi del campo, per trattare una fascia di m 0,5 – 1, quindi non trattando direttamente le colture).

COLTURA	N. appl.	DOSE Kg/ha	Giorni * pre-raccolta
ORTAGGI A STELO (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Porro, Cuori di Palma, etc.)	2-3	4.2	7

(*) Sospendere i trattamenti seguendo i giorni di carenza riportati in tabella

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.

NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.