

DEMETRINA® FLOW FRMPE


**Insetticida in sospensione concentrata
MECANISMO D'AZIONE: IRAC 3A**

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con

effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non

dispersedere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccolgere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti

sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-

benzotriazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi

per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

Via Tonale 15

ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUITO DA

Ital-Agro srl, Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Registrazione Ministero della Sanità n° 15213 del 01/08/2011

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/10/2019; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 1-10-50-100-200-250-500

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per la protezione degli organismi acquatici applicare le misure previste alla voce "Avvertenza".

Il prodotto è nocivo per api e insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre- e postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

DEMETRINA FLOW è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesa ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfezione.

ETICHETTA USO NON PROFESSIONALE

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Le dosi riportate in ml/ha si riferiscono a trattamenti a basso o ultra-basso volume aumentate proporzionalmente le dosi, per garantire la stessa quantità di prodotto ad ha. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Numero massimo di trattamenti ed intervallo d'intervento (salvo diversa indicazione per singola coltura): N. 3 ogni 7-14 giorni.

FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino): su Ciliegio e Susino 3 trattamenti ogni 14 giorni: contro neanidi di Cocciniglia S. José in trattamenti estivi, Psilla, Cidia e Anarsia: 90 ml/ha.

- contro Capua, Cacoecia, Miteoepididottori minatori di melo e pero, Anthonomus, Maggiolino, Tentredine: 60-90 ml/ha. - contro Afride verde del melo, Afridi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta: 70-90 ml/ha.

- contro *Aromia bungii* di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino: 60-90 ml/ha. In interventi localizzati al tronco: 200 ml/ha. **MANDORLO** (3 trattamenti ogni 14 giorni): - contro Afridi (*Myzus p.*, *Hyalopterus pruni*), Cidia e Anthonomus (*amagdali*): 70-87 ml/ha.

VITE: contro Cicaline, Tigiole, Afridi, Sigarato, Afride, Piratide: 70-90 ml/ha.

OLIVO (da olio e da tavola): contro Mosca dell'olivo, Tigiola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide: 80-90 ml/ha (Olio da Olio 3 trattamenti ogni 14 giorni)

ORTAGGI in campo (e serra dove specificato):

- **CARCIOFO, CAVOLI A FIORESCENZA** (broccoli e cavolfiori), **C. CAPPUCCIO, CETRIOLO** (in campo ed in serra), **FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA** (in campo ed in serra), **LATTUGHIE E INSALATE** (escluso scarola/indivia a foglie larghe e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), **MELANZANA** (in campo ed in serra), **PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO** (in serra), **PEPERONE, RUCOLA, FOGLIE DI SEDANO, ZUCCHINO** (in campo ed in serra), **ZUCCA** (in campo ed in serra): 3 trattamenti ogni 7-14 giorni;

- **C. DI BRUXELLES** massimo 2 trattamenti ogni 7 giorni;

- **CAROTA, POMODORO (in campo), MELONE, CIPOLLA, AGLIO:** 3 trattamenti ogni 14 giorni;

- contro Aliche, Cavolaia, Dorifora, Notte, Tentredini, Tripidi: 60-70 ml/ha; - contro Afridi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piratide, Cavallette: 80-90 ml/ha. **FRUMENTO** (3 trattamenti ogni 14 giorni), **ORZO, MAIS:** contro Piratide, Diabrotica del mais, Afridi, Cimici, Notte, Tripidi: 0,6-0,8 l/ha.

FLOREALI: in campo contro Afridi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi: 80-90 ml/ha.

ORNAMENTALI: in campo contro Afridi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri: 80-90 ml/ha. **COMPATIBILITÀ -** Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: per i trattamenti in pieno campo rispettare bande di rispetto dai corpi idrici come indicato in tabella.

INTERVALLO DI SICUREZZA: aglio, cipolla, porro, foglie di sedano, patata, cavoli di Bruxelles, carota, olivo da olio, ciliegio e susino: 7 giorni; agrumi, mandorlo, frumento: 30 giorni. Altre colture: 3 giorni.

"ATTENZIONE" Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 24/01/2017, modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 08/01/2019 e modificata ai sensi del DM del 22/01/2018 con validità a partire dal 27/01/2019

<i>Colture</i>	<i>Banda di rispetto (metri)</i>				
Melo, pero	Applicazioni precoci	20	-	Applicazioni tardive	-
Drupacee, agrumi, fruttiferi a guscio, olivo	Applicazioni precoci	dose min 20	dose max 20	Applicazioni tardive	-
Vite	Applicazioni precoci	dose min 5	dose max 10	Applicazioni tardive	dose min 10 dose max 20
Cereali, ortaggi, patata, fragola, floreali ed ornamentali					5